

# 農作物生産情報

(平成29年8月)

## 気象

(平成29年7月25日 仙台管区気象台発表 東北地方3ヶ月予報より)

東北日本海側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。気温は、平年並または高い確率ともに40%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

## 水稲

生育に合わせた適切な水管理をしよう！  
斑点米カメムシ類と穂もちの防除を徹底しよう！

### 1 生育概況

管内生育観測ほの幼穂形成期到達状況の平均値で見ると、「つがるロマン」は平年より1日、「まっしぐら」は平年より2日、「青天の霹靂」は前年より2日遅かったが、地域や田植えの早晩による生育差が大きい。

今後、気温が平年並みに推移した場合、生育の早い地点では「つがるロマン」で8月2日頃、「まっしぐら」で8月3日頃、「青天の霹靂」で8月2日頃に出穂期（ほ場全体で50%が出穂した時期）になると見込まれる。

管内生育観測ほ等の幼穂形成期到達状況と出穂期の見込み

品種名	幼穂形成期	出穂期の見込み
つがるロマン (管内8地点)	7月11日～19日	8月2日 ～8月10日
まっしぐら (管内9地点)	7月9日～15日	8月3日 ～8月9日
青天の霹靂 (管内12地点)	7月9日～17日	8月2日 ～8月10日

注1) 幼穂形成期～出穂期の日数は、生育観測ほ平均で「つがるロマン」が22日間、「まっしぐら」が25日間、「青天の霹靂」が24日間である。出穂期の見込みは今年度の幼穂形成期に所定の日数を加算して算出した。

注2) 今後は平年より気温が高いことが予想されているため、出穂期は早まる可能性がある。

## 2 水管理

高温時には時々水の入れ替えや掛流しを行い、根の活力を維持する。

これからの水管理

生育期	寒い日	暖かい日	備考
出穂開花期	(最高気温25℃以下) 水深10cm	水深5～6cm 時々水の入替	最高気温25℃以下で 開花・受精不良
登熟期	(最低気温15℃以下) 水深10cm以上	水深2～3cm 湿田は間断灌漑	台風時は脱水症状防 止のため水深6cm前 後
落水時期	湿田では出穂後20～25日目 乾田では出穂後30～35日目		落水が早すぎると収 量・品質が低下する

## 3 病虫害防除

### (1) 斑点米カメムシ類

薬剤防除は、残効性が高い薬剤を使用する1回散布体系の場合は穂揃期(80%の穂が出穂した時期)～穂揃14日後に散布する。

2回散布体系の場合は、1回目を穂揃期、2回目を穂揃期の7～10日後に薬剤を散布する。

病虫害発生予報等で多発生が予想される場合、最終散布の7～10日後に追加防除を行う。

防除の際は水田だけでなく畦畔にも散布し、できるだけ広域一斉散布を行う。

やむなく出穂後に草刈りを行う場合は、薬剤散布後速やかに行う。

### (2) 穂いもち

出穂直前(走り穂が見えた時期)と穂揃期の2回散布を徹底する。多発生が予想される場合には、穂揃期5～7日後にも薬剤散布を行う。

### (3) 紋枯病

前年の菌核が伝染源であるため、前年に発生が多かったほ場では、出穂直前に茎葉散布を行う。

○「青天の霹靂」は使用できる農薬成分回数が市町・JAで異なります。

農薬使用の際には必ず確認しましょう。

○農薬を使用する際には、使用回数・使用時期等を確認しましょう。

# りんご

見直し摘果の徹底で、ワンランク上の果実を生産しよう！  
黒星病の被害果は、土に埋めるなど適切に処分しよう！

県生育観測ほ（板柳町高増）のふじの果実肥大は、7月21日現在、横径5.7 cm（平年比108%）で平年を上回っている。

7月12日に西北地域15地点で行った着果状況調査結果では、全般に着果量が多い傾向であった。

## 1 見直し摘果

仕上げ摘果が終了した園地でも、見落としや過着果の部分がないか、もう一度園地を見回り、見直し摘果を行う。見直しに当たっては、黒星病などの病害虫被害果や傷害果、肥大の劣るものや果形の悪いものなどを中心に摘果する。

なお、摘み取った病害虫被害果は、適切に処分する。

## 2 徒長枝の整理、支柱入れ及び枝吊り

病害虫の発生源を少なくし、薬剤の到達と日光の透過をよくするために、黄色品種でも不要な徒長枝は切り取る。

また、果実が大きくなるにつれて枝が下がり、重なり合ってくるので、日焼けが発生しないように注意しながら、支柱入れや枝吊りを行う。

なお、高温・晴天が続く場合は、果実に日焼けが発生しやすいので、徒長枝の整理、支柱入れ、枝吊りなどは控える。

## 3 病害虫防除

散布予定日に降雨が予想される場合には、事前散布に徹する。なお、薬剤の散布に当たっては、収穫前日数や年間使用回数などに注意する。

### (1) 薬剤散布（県りんご病害虫防除暦より抜粋）

散布時期	対象病害虫	基準薬剤	
8月半ば (8月15～16日頃)	斑点落葉病	ベフラン液剤25	1,500倍
	炭疽病	又はアリエッティC水和剤	800倍
	ハダニ類	又はダイパワー水和剤	1,000倍
	モシクイ <sup>※</sup>	又はナリアWDG	2,000倍
8月末 (8月30～31日頃)	斑点落葉病	ベフラン液剤25	1,500倍
	炭疽病	又はフリントフロアブル25	3,000倍
	ハダニ類	又はストロビードライフロアブル	3,000倍
	モシクイ <sup>※</sup>	又はナリアWDG	2,000倍

○ベフラン液剤25及びアリエッティC水和剤は、他薬剤と組み合わせる場合、最後に調合する。

○スミチオン水和剤40は、ストロビードライフロアブルとの組み合わせで

「つがる」に薬害を生じた事例がある。また、フrintフロアブル25又はナリアWDGとの組み合わせで、「つがる」に薬害を発生させるおそれがある。

- フrintフロアブル25+オマイト水和剤、又はナリアWDG+オマイト水和剤との組み合わせ、「つがる」に薬害を発生させるおそれがある。
- 同一系統の薬剤であるストロビードライフフロアブル、フrintフロアブル25、ナリアWDGは薬剤耐性の懸念があるので、各薬剤の使用は年1回以内とし、合わせて年2回以内の使用とする。
- 「つがる」などの早生種、「夏緑」など極早生品種に散布する場合、使用時期に十分注意する。

(2) 黒星病対策

各地で黒星病の発生が見られているので、病原菌の密度を下げるために被害葉や被害果は摘み取り、土中に埋めるなど適切に処分する。

また、葉や果実のほかに、つる（果柄）にも発生するので、被害果はつるごと摘み取る。

(3) 斑点落葉病対策

急増の恐れがある場合は、ポリオキシシAL水和剤1,000倍も使用する。

(4) モモシクイガ対策

無袋栽培では毎回モモシクイガの防除剤を使用する。被害果は見つけ次第摘み取り、土中深く埋めるなど適切に処分する。

(5) ハダニ類対策

急増しやすい時期なので、発生が見られる場合は殺ダニ剤を使用する。

なお、殺ダニ剤は薬剤抵抗性が出やすいので、同一薬剤は年1回の使用にとどめる。

(6) リンゴコカクモンハマキ対策

8月以降、発生が多い場合は、果実に接触している葉を早めに摘み取る。

(7) クワコナカイガラムシ対策

発生が多い樹では、8月上旬に防除剤による胴木洗いを実施する。また、誘殺用のバンドを8月中旬の第1世代成虫の産卵前までに巻き付ける。

#### 4 収穫前落果の防止

収穫前落果が多い「つがる」や「きおう」は、落果防止剤を散布して落果を防ぐ。

(1) ストッポール液剤

ストッポール液剤の使い方

品 種	散 布 時 期	回 数	倍 数	散 布 量
未希ライフ き お う	収穫開始予定日の20～15日前 本年：8月10～15日頃 (平年：8月10～15日頃)	1 回	1,000倍	350～400 <sup>リットル</sup> ／10 a
つ が る	収穫開始予定日の25日前 本年：8月15～20日頃 (平年：8月15～20日頃)			

### 【使用上の注意】

- ①単用散布（展着剤不用）とする。
- ②散布後7日間は収穫できない。
- ③「未希ライフ」や「きおう」に対して早期散布すると、つる割れの発生や果肉の軟化など、品質低下を招いた事例があるので、基準以外の使い方をしない。
- ④「つがる」に対して、伸長中の新梢の先端部枝葉に薬害が出るがあるので、高温時（28℃以上）の散布は行わない。
- ⑤果実の熟度を進ませる傾向があるので、**収穫や販売を遅らせないようにする。**
- ⑥「つがる」に対して、本剤の2回散布や早出しを目的とした極端な早期散布、着色促進剤等との併用を行うと、果実の軟化や油上がりが著しく早まるほか、年によって裂果やつる元の腐敗が多く見られるので、上表以外の使い方はしない。
- ⑦葉から吸収されて効果を出すので、葉に十分かかるようにする。
- ⑧葉摘みは散布4～5日後から始める。

### (2) ヒオモン水溶剤

#### ヒオモン水溶剤の使い方

品 種	散 布 時 期	回 数	倍 数	散 布 量
つ が る	収穫開始予定日の21日前 本年：8月20～25日頃 (平年：8月20～25日頃)	1回	2,000倍	300～600 <sup>リットル</sup> ／10a

### 【使用上の注意】

- ①単用散布（展着剤不用）とする。
- ②散布後4日間は収穫できない。
- ③散布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見極めてから散布する。
- ④高温時の散布は避ける。
- ⑤薬液が葉先からしたたり始める程度にむらなく、樹全体にていねいに散布する。
- ⑥果実の熟度や日持ち性は無処理の果実と同等である。

## 5 風害防止対策

台風等に備え、防風網やわい性台樹の結束などについて、再度点検し、補強や取り替えを行う。

また、幹や主枝などに空洞が生じている樹や、腐らん病の被害等を受けた枝や樹は、支柱で支え、縄などで補強する。幼木は倒伏しやすいので支柱を立てて結束する。

機械やハシゴの事故が増えています！ 農作業は焦らず、急がず、慎重に！！

# ぶどう

良品生産に向け、適正な管理に努めよう！

## 1 摘粒及び摘房

着色不良果（赤目）防止や房枯れ症状予防のため、遅くとも着色始め頃（8月中～下旬）までに再度着房数を点検し、摘房を終える。また、支梗単位での切除や摘粒を行い、適正な大きさの果房に整える。

着房の目安

結果枝の葉数	着房程度
葉数が13枚以下	成らせない
〃 14～18枚	1房
〃 20枚前後	1～2房
〃 25枚以上	2房

## 2 新梢（結果枝）の管理

新梢が徒長している園地では、随時摘心を行い、過繁茂防止に努める。また、新梢の基部まで十分日光が当たるように誘引する。

## 3 病虫害防除

散布予定日に降雨が予想される場合には、事前散布に徹する。なお、薬剤の散布に当たっては、収穫前日数や年間使用回数などに注意する。

(1) 薬剤散布（県特産果樹病虫害防除暦スチューベン基準より抜粋）

散布時期	対象病虫害	基準薬剤
8月上旬	晩腐病	アミスター10フロアブル 1,000倍
	べと病	又はストロビードライフロアブル 2,000倍
	灰色かび病	又はホライズンドライフロアブル 2,500倍

注）この時期の散布は、果面汚染防止のため展着剤を使用しない。

(2) 晩腐病対策

発生が多い園地では、アミスター10フロアブル又はストロビードライフロアブルを選択する。

なお、ストロビルリン単剤のアミスター10フロアブルとストロビードライフロアブル及び同じ系統の混合剤であるホライズンドライフロアブルは、薬剤耐性を生じる懸念があるので、合わせて年2回以内の使用とする。

(3) べと病対策

被害葉・果房は見つけ次第摘み取り、処分する。また、排水対策、薬剤散布など防除対策を徹底する。

(4) 灰色かび病対策

長期貯蔵向けの灰色かび病対策として、8月下旬から9月上旬にフルーツセイバー1,500倍を特別散布する。

# 大豆

病害虫防除をしっかりと行おう！

## 1 雑草防除

中耕及び除草剤で除草しきれなかった雑草は手取りする。

## 2 病害虫防除

### (1) 開花期前後（8月上旬）

アブラムシや食葉害虫の発生が多いほ場では防除する。

### (2) マメシンクイガ（8月下旬～9月上旬）

連作で発生が多くなる。

8月第6半旬～9月第1半旬に1回防除を行う。多発生の場合には散布時期を早め、8月第5半旬と、その7日後に2回、薬剤散布を行う。合成ピレスロイド剤は残効期間が長いが、莢に食入した幼虫には効果がない。有機リン剤は残効期間が短い、莢に食入した幼虫にもやや効果がある。

### (3) 紫斑病

紫斑病の防除は、開花期後20～40日の間に防除を行う。これまで発生していないほ場では1回、発生しているほ場では2回、散布を行う。

県内でチオファネートメチル剤耐性菌が検出されたため、該当薬剤の使用を控える。

## 3 水管理、排水対策

開花後から子実肥大の初期は過湿、過乾燥の影響を強く受ける時期である。

この時期の水分ストレスがシワ粒の原因になるので、排水対策と合わせ、水分不足にならないよう管理を徹底する。

# トマト

高温期に対応した肥培管理を行おう！

## 1 追肥とかん水

1回当たりの追肥量は液肥の場合、10a当たり窒素成分で0.3～0.5kgとし、1～2日おきを目安に行う。追肥の間隔や量は、草勢を見ながら決める。

かん水は1株当たり1.5リットル、毎日～1日おきを目安とするが、高温が続く場合や摘葉を最小限にとどめる場合は、かん水量を増やし草勢をコントロールする。

また、高温が続く場合は、7～10日間隔で通路かん水も実施する。

## 2 温度管理

ハウス内温度が高温にならないよう注意し、サイドの開放だけでなく、肩換気やツマ換気を行う。

### 3 病害虫防除

病害は、灰色かび病、葉かび病を主体に、作用性の異なる薬剤を組み合わせたローテーション散布とする。

また、灰色かび病、葉かび病は、ハウス内の湿度が高く通気性が悪いとまん延しやすくなるので、①換気、②通路マルチ、③下葉の摘葉(収穫終了果房下)等の耕種的防除も併せて行う。

虫害は、アブラムシ類、アザミウマ類のほか、タバコガ類の発生も見られているので、よく観察して防除薬剤を選択する。

気温の低下とともに、疫病やうどんこ病、オンシツコナジラミの発生が増加するので、発生に注意して薬剤散布する。

## 花 き

ハウスの温度管理と病害虫の防除を徹底しよう！

### ◆キ ク◆

#### 1 今後の作業

- ・夏秋ギクの収穫は、花卉が着色し、2～3分咲きの時に行う。収穫後は、株養成のため、土寄せや追肥を行う。
- ・秋ギクはハウスを積極的に換気する。また、高温時は必要に応じて遮光し、ハウス内温度をできるだけ下げようとする。特に、シェード栽培では、夜間開放を行い夜温を下げる。

#### 2 病害虫防除

ヤガ類、アザミウマ類、ハダニ類等の早期発見・早期防除に努める。

### ◆トルコギキョウ◆

#### 1 今後の作業

- ・高温期は葉先枯れ等の生理障害が出やすいため、換気を積極的に行い、遮光やカルシウム剤の葉面散布等による予防に努める。
- ・発蕾期以降は、原則かん水を控えるが、朝夕の涼しい時間帯でも萎れるようであれば軽くかん水を行う。
- ・発蕾後は、すみやかに1番花を摘み取り、2番花以降の揃いを良くする。
- ・収穫は、朝夕の涼しい時間帯に行い、直ちに前処理剤で処理する。

#### 2 病害虫防除

ヤガ類、アザミウマ類等の早期発見・早期防除に努める。



## 農作業中の熱中症に注意しましょう

- 暑さの感じ方は人によって異なります！高齢の方は特に注意が必要です！
- まわりが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です！
- 節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようにご注意ください！

## 5～8月は「農薬危害防止運動」実施期間です

- 安心な農産物生産のため、農薬の使用状況を必ず記帳しましょう。
- 農薬使用の際には、必ず使用者の責任で最新の「農薬登録情報」を確認しましょう。
- 短期暴露評価の導入により使用方法の変更が予定されている農薬は、容器に表示された使用方法ではなく、変更後の使用方法に基づいて使用しましょう。
- 農薬は鍵のかかる専用の場所に保管し、管理を徹底しましょう。