

I 第8週の発生動向 (2009/2/16~2009/2/22)

- インフルエンザについては、東地方+青森市、上十三保健所管内において、前週に引き続き**警報**が続いています。八戸、五所川原保健所管内においては**注意報**が続いています。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎については、弘前保健所において、**警報**が続いています。
- 水痘については、東地方+青森市保健所管内において、新たに**注意報**が出されました。

II 第8週五類感染症定点把握 注：五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

| 疾患番号・疾患名 | 東地方+青森市 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 増減数 <small>(前週からの増減)</small> | 東地方(再掲) | | 青森市(再掲) | | 定点数 | | | | | |
|--------------------|---------|-------|----|------|-----|-------|------|-------|-----|-------|----|-------|------|-------|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------------------|-----|----|----|----|--|
| | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 保健所名 | 小児科 | 内科 | 眼科 | 基幹 | |
| (85) インフルエンザ | 160 | 11.43 | 93 | 6.20 | 167 | 11.93 | 131 | 18.71 | 198 | 22.00 | 45 | 7.50 | 794 | 12.22 | -347 | 16 | 8.00 | 144 | 12.00 | インフルエンザ (内科+小児科) | | | | | |
| (74) RSウイルス感染症 | | | 1 | 0.11 | | | | | | | | | 1 | 0.02 | -2 | | | | | | | | | | |
| (75) 咽頭結核膜炎 | 1 | 0.11 | | | | | 1 | 0.20 | | | 4 | 1.00 | 6 | 0.14 | -9 | | | 1 | 0.13 | | | | | | |
| (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | 1.56 | 27 | 3.00 | 8 | 0.89 | 9 | 1.80 | 11 | 1.83 | 1 | 0.25 | 70 | 1.67 | -19 | 3 | 3.00 | 11 | 1.38 | | | | | | |
| (77) 感染性胃腸炎 | 69 | 7.67 | 46 | 5.11 | 32 | 3.56 | 13 | 2.60 | 27 | 4.50 | 45 | 11.25 | 232 | 5.52 | 0 | 10 | 10.00 | 59 | 7.38 | | | | | | |
| (78) 水痘 | 40 | 4.44 | 9 | 1.00 | 6 | 0.67 | 9 | 1.80 | 8 | 1.33 | 9 | 2.25 | 81 | 1.93 | 43 | 5 | 5.00 | 35 | 4.38 | | | | | | |
| (79) 手足口病 | 16 | 1.78 | 5 | 0.56 | | | | | | | 2 | 0.50 | 23 | 0.55 | -11 | | | 16 | 2.00 | | | | | | |
| (80) 伝染性紅斑 | | | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | | | | | | | 3 | 0.07 | -4 | | | | | | | | | | |
| (81) 突発性発しん | 15 | 1.67 | 4 | 0.44 | 2 | 0.22 | 2 | 0.40 | 2 | 0.33 | | | 25 | 0.60 | 3 | 3 | 3.00 | 12 | 1.50 | | | | | | |
| (82) 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| (83) ヘルパンギーナ | | | 1 | 0.11 | | | | | | | | | 1 | 0.02 | 0 | | | | | | | | | | |
| (84) 流行性耳下腺炎 | 6 | 0.67 | 4 | 0.44 | | | 3 | 0.60 | | | | | 13 | 0.31 | 0 | | | 6 | 0.75 | | | | | | |
| (86) 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| (87) 流行性角結膜炎 | | | | | 3 | 1.50 | 1 | 1.00 | | | | | 4 | 0.36 | -5 | | | | | | | | | | |
| (95) マイコプラズマ肺炎 | | | | | 2 | 2.00 | | | | | | | 2 | 0.33 | -2 | | | | | | | | | | |

■ は警報 ■ は注意報 「空欄」：患者発生数0

III 表II以外の感染症法対象疾患 (注：届出数は速報値です)

(9) 結核(二類全数把握疾患)：弘前2人、八戸2人、五所川原1人、上十三3人

(21年計：53人)

過去への全数把握疾患については、月報をご覧ください。

感染症の感

梅毒




図 国内における患者数推移(2004-2008年)

表 全国及び青森県における患者数

| 年 | 全国 | 青森県 |
|------|-----|-----|
| 2004 | 535 | 1 |
| 2005 | 543 | 2 |
| 2006 | 637 | 3 |
| 2007 | 714 | 3 |
| 2008 | 823 | 2 |

梅毒の患者届出数が、2005年以降増加傾向にあります(上図)。梅毒は、スピロヘータ(らせん状の細菌)の一種である梅毒トレポネーマ(*Treponema pallidum*)を病原体とする性感染症です。感染は粘膜接触を伴う行為によって病原体が伝播し、感染部位での病変が血行性に全身に散布され種々の全身症状を引き起こします。妊娠中に夫から感染したとみられる症例も報告されており、感染したことを知らずに出産し、母体から胎盤を通じて胎児に感染する場合があります。その場合、乳幼児期は無症状で、学童期以後に眼や耳などに症状が現れ重症化したり後遺症を残すこともあります。本県においては、年間1人から3人の報告数ですが、全国的に増加していることから妊婦検診を必ず受けるなどの感染予防対策が重要です。治療は、泌尿器科または、性病科等において、抗生物質の内服や注射により行います。


IV インフルエンザ情報 第8週 (2/16~2/22)

迅速診断キットによる型別は、以下の通りです。

| | 東地方 | 弘前 | 八戸 | 五所川原 | 上十三 | むつ | 青森市 |
|-------------------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|
| インフルエンザ報告数 | 16 | 93 | 167 | 131 | 198 | 45 | 144 |
| A型 | 16 | 73 | 138 | 47 | 152 | 44 | 31 |
| B型 | 0 | 20 | 16 | 84 | 36 | 1 | 0 |

A型が流行していますが、五所川原保健所管内ではB型の報告数の方が多いことから他の管内においても今後の動向に注意が必要です。

V 保健所管内別届出数推移 * Adobe Reader は、最新のバージョンをお願いいたします。



注：警報開始基準値は30人/定点、終息基準値は10人/定点、注意報レベルは10人/定点です。

VII 全国及び青森県における届出数推移 (2007-2008シーズン - 2008-2009シーズン)



関連情報 今年度の標語 《あ、その咳、そのくしゃみ～咳エチケットしてますか?～》

厚生労働省：今冬のインフルエンザ総合対策について <http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou01/index.html>

保健衛生課：インフルエンザの予防について http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/08-09seasonal_flu.html

インフルエンザワクチン予防接種実施医療機関情報 http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/flu_shot.html