

HIV検査

○HIV検査は、HIVに感染しているかどうかを調べる検査です。
○血液検査で確かめることができます。



検査を受ける時期

○HIVに感染してすぐの時期は、検査では感染しているかどうか分かりません。
○検査は、感染の可能性があった日から2~3ヶ月経ってから受けましょう。

早期発見の大切さ

○HIV検査は、感染を知る唯一の手段です。
○検査結果を知ることで、パートナーへの感染を防ぐことができます。
○「自分には関係ない」と思わず、ぜひ検査を受けましょう。

★県内保健所の検査受付情報は、
青森県庁ホームページへ！



検査は保健所で受けることができます

○保健所での検査は、**無料・匿名**(名前や連絡先を聞かれない)で受けることができます。
○また、一緒に性器クラミジア、梅毒の検査も受けることができます。

★HIV・エイズ、性感染症のことをもっと知るためには、こちらからも！

HIV検査・相談マップ



エイズ予防情報ネット



東北ブロック AIDS/HIV情報ページ



東京都HIV検査情報Web



知っておきたい エイズ・性感染症のこと



高校生のみなさん、意識調査へのご協力、
ありがとうございました。

調査を終えて、

「あの言葉ってどういう意味だったんだろう？」
「性感染症、ちょっと気になるけど、よく分からないな...」
など、それぞれに感じたことがあるかもしれません。

この機会に、「エイズ・性感染症」のこと、
少し考えてみませんか？
このパンフレットが、エイズや性感染症への理解を深める
きっかけになれば、さいわいです。

HIV感染・性感染症を予防するには

○HIV感染・性感染症の最も多い感染経路は、性行為ですので、予防には

- ★コンドームを正しく使用すること
- ★不特定多数との性行為を避けること が重要です。

- ・お風呂や食器、トイレの共用
- ・汗
- ・プールや温泉
- ・蚊



などでは基本的に感染はしません。

※ただし、明らかに血液が付着しているなどの場合は、
感染のリスクがあるので、接触しないように注意が必要です。

青森県健康医療福祉部保健衛生課

HIVとは

「ヒト免疫不全ウイルス」のことです。免疫のしくみの中心である白血球などに感染し、免疫力を低下させます。感染しても数年間は自覚症状がありません(この状態をHIV感染者と呼びます)。

エイズ (AIDS) とは

日本語で、「後天性免疫不全症候群」といいます。HIVというウイルスに感染し、免疫力が低下することによって、さまざまな疾患を発症するようになります。


HIVは**ウイルスの名前**、**エイズ (AIDS)**は**病気の名前**です。

HIV感染後すぐにエイズになるわけではありません。自覚症状のない時期が数年続き、徐々に免疫力が低下し、様々な疾患を発症するようになります。




発生状況

〈全国〉



〈青森県〉



- 日本では、新規のHIV感染者・エイズ患者が毎年報告されています。
- 青森県でも、毎年新たなHIV感染者・エイズ患者が報告されています。**
(令和5年:HIV感染者2名、エイズ患者4名)

感染経路

HIVは、主に3つの経路で感染します。

性行為による感染

- 最も多い感染経路です。
- HIVは主に血液や精液、膣分泌液に多く含まれています。
- そのため、性器や肛門、口などの粘膜や傷口を通じて感染します。



血液を介しての感染

- HIVが存在する血液の輸血や、注射器具の共用(覚醒剤の回し打ちなど)によって感染します。



母子感染

- 母親がHIVに感染している場合、妊娠中や出産時に赤ちゃんに感染することがあります。



HIV感染・エイズの治療

- HIVには、**効果的な治療法があります。**
- 抗HIV薬を毎日服用して、ウイルスの増殖を抑えます。
- 適切な治療を受けることで、感染前と変わらずに生活や仕事をする事ができ、寿命をまっとうすることができます。

性感染症ってなんだろう？

梅毒 (ばいどく)

- 性行為による感染から、
- ・約3週間後:性器に大豆くらいの赤いしこりが現れる(痛みはなし)。
- ・約3ヶ月~3年後:赤い発疹が、手のひらや全身に現れるのが特徴。放置すると重症化することもある。
- 症状は、一旦消えることもあり、治ったと勘違いすることもある。

淋菌 (りんきん) 感染症

- 男性は尿道炎(痛みや膿がでる)、女性は子宮の炎症を起こす。
- 特に女性は症状が軽いため、感染症に気がつかないまま悪化し、不妊の原因になることがある。

性器ヘルペス感染症

- 男性、女性ともに性器の皮膚や粘膜に、水ぶくれが現れる(痛みあり)。

性器クラミジア感染症

- 男性は尿道炎(痛みなど)、女性はおりものの増加が現れるが女性の多くは症状がないことがあり、気がつきにくい。
- 進行すると、男女ともに不妊症の原因に。