


## 韓国で口蹄疫が発生

2019年1月29日、韓国京畿道安城市の牛飼養農場において口蹄疫の発生が確認されました。2月5日には中国をはじめとするアジア近隣諸国で春節を迎え、人・物の移動が盛んになることから病原体の侵入するリスクが非常に高まっている状態です。今一度、本病の発生予防を徹底しましょう。

過去の日本での発生をみると  
まず韓国で発生しています!

韓国における口蹄疫の状況 (2019年1月以降)



2000年 → 2000年

2002年

2010年 → 2010年  
2011年

2014年 → 現在  
現在

京畿道(1件)

①1月29日 安城(アンソン)市 牛 (O型)

日付は韓国当局発表日



発生件数: 1件

2019年1月29日現在  
農林水産省動物衛生課

(韓国農林畜産食品部資料より)

侵入する可能性  
は非常に高い!!

●: 発生地点

※発生日はOIE報告または韓国当局の公式資料に基づく

### 発生予防の徹底をお願いします!

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場に持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。
- 農場や畜舎の出入口に**踏込消毒槽等**を設置することにより、出入りする人の**靴底の消毒**を徹底しましょう。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これら国の**農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。
- 毎日、飼養家畜の健康観察**を行いましょう。



むつ家畜保健衛生所  
090-5841-6810



## 効果的な消毒を実施しましょう！

### ◎ 効果的な消毒のポイント

- ・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。
- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分や運転席の足元スペース**も可能な限り消毒しましょう。

### 《要注意》

- ★ **逆性石けんは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しない**こと！

### 推奨される 踏込消毒槽の設置方法



② 消毒液の槽  
↑  
① 水洗の槽

例えば**ビルコンと消石灰**

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

### ～牛の症状～

写真：宮崎県提供



写真：動物衛生研究部門提供

### ～豚の症状～



毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に連絡しましょう。

牛では、**1頭のみに着目せず**、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に広がるなど、**群としての異状の有無を確認することが重要**です。