

# 農作物生産情報 (令和5年6月)

## 気象

(令和5年5月25日 仙台管区気象台発表 東北地方1か月予報より)

期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

平均気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

日照時間は、平年並または少ない確率ともに40%です。

## 水稲

きめ細かな水管理で生育促進に努めよう！

### 1 水管理

分けつ（茎数の増加）の適水温は、日最高で30～32℃、日最低で15～17℃、日較差15℃前後である。

日平均水温が19℃以下になると分けつの発生が少なくなるため、昼間止水・夜間かんがいを基本とし、暖かい日は浅水で水温を上昇させ、寒い日は深水で保温する。また、漏水防止に努め、掛け流しはしない。

水田にガスが発生し生育が不良の場合は、6月中旬ころに3～5日程度の落水管理を行う。

有効茎数（1株茎数で「青天の霹靂」は18本程度、その他の品種は20本程度）を確保し、6月末頃から平均気温が20℃以上で晴天が続くようであれば中干しを行う。中干しは田面に軽く亀裂が入る程度とする。

### ■ 水管理の目安

生育期	暖かい日	寒い日
分けつ期	3cm程度の浅水	5～6cm程度の深水
有効茎数確保後	中干し	5～6cm程度の深水

### 2 雑草防除

#### (1) 初期除草剤と中・後期除草剤の体系処理の場合

初期除草剤処理後の雑草の発生を見ながら中期剤を選択する。

除草剤の散布後は、除草効果の維持と水質汚染防止のため、散布後7日間は止水し、落水や掛け流しをしない。

#### (2) 一発剤を使用し、残草が見られた場合

残った草種に応じて除草剤を散布する。除草剤は使用基準を必ず守り、他の作物に飛散しないように注意する。

## ■ 残った草種別に使用できる除草剤の例

- ア 広葉雑草（アゼナ・ホタルイ等）のみ → バサグラン液剤・粒剤
- イ ノビエのみ → クリンチャー1キロ粒剤・EW  
又はヒエクリーン1キロ粒剤  
又はワンステージ1キロ粒剤
- ウ 広葉雑草 + ノビエ → クリンチャーバスME液剤  
又はワイドアタックSC  
又はワイドパワー粒剤  
又はヒエクリーンバサグラン粒剤  
又はグラスジンMナトリウム粒剤

## 3 病害虫防除

### (1) イネミズゾウムシ

移植前や移植時に防除をしなかった場合は、発生に応じて防除する。発生が多い場合は、6月上旬に水面施用剤を散布する。この時期の防除でイネドロオウムシも防除できる。

### (2) 斑点米カメムシ類

カメムシの発生源となっている水田周辺の休耕田や、カメムシを誘引する畦畔の雑草（主にイネ科雑草）は、開花・結実する前に刈り取る。また、雑草の刈取りは水稻の出穂7日前までに終了する。

### (3) 葉いもち

取り置き苗は、葉いもちの発生源となるので、補植が終わったら、直ちに処分する。

葉いもちは、早い年には6月下旬に発生がみられるので、ほ場をこまめにチェックし、病斑が見られた場合には、航空防除まで待つのではなく、直ちに防除する。

復元田や、いもち病に弱い品種を作付けした場合は、葉いもちの発生が見られなくても、水面施用剤による予防防除を必ず行う。

水面施用剤は、6月20日前後から6月末までに湛水のまま施用する。施用後1週間は止水し、落水、掛け流しをしない。その間の入水は、水尻を止めたままで行う。

※ 「青天の霹靂」は、農薬の成分使用回数を地域慣行の1/2以内とすることが必須なので、農薬の使用に際しては成分数を確認する。

## 農作業中の熱中症に注意しましょう

- 暑さの感じ方は人によって異なります！高齢の方は特に注意が必要です。
- まわりが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。

## 畑 作

大豆の雑草防除と中耕・培土をしっかりと行おう！

### ◆大豆◆

#### 1 は 種

砕土が粗いと発芽率が劣るので、砕土はていねいに行う。

は種量は「おおすず」で7 kg/10a を基準とする。

は種直後の多雨は、出芽や初期生育の不良を招くので、気象情報に注意しながら作業する。

は種作業は6月10日頃までに終わるようにする。やむを得ず、は種が遅れる場合は畦幅や株間を詰めて、は種量を増やす。

#### 2 雑草対策

##### (1) 土壌処理剤

土壌処理剤は、は種後速やかな散布が望ましい。ほ場表面の水分が低いと効果が劣り、また、出芽した雑草には効果がないので注意する。

##### (2) 茎葉処理剤

イネ科雑草用の茎葉処理剤は、薬剤により効果が異なるので発生状況に合わせて選択し、効果的に使用する。

広葉雑草に使用できる茎葉処理薬剤は大豆バサグラン液剤とアタックショット乳剤がある。両剤とも「薬害と収量に及ぼす影響及び除草効果の注意書き」を確認のうえ使用する。散布回数はいずれも1回なので、大豆の茎葉がうね間を覆う前に使用する。

##### (3) 畦間処理

土壌処理、茎葉処理で残草が多い場合は、畦間処理の除草剤が利用できる。ただし、大豆に薬剤が飛散しないよう、専用ノズル、カバー等を使用する。

##### (4) 中耕・培土

1回目：本葉2～3葉期 初生葉のつけ根まで軽く土寄せする。

2回目：本葉5～6葉期 第1本葉のつけ根まで土寄せする。

### ◆小麦◆

#### 1 病害虫防除

##### (1) うどんこ病、赤さび病

早期発見に努め、発生初期での防除に努める。薬剤は下葉にも十分付着するように散布する。

##### (2) 赤かび病

開花から10日程度の間には感染しやすいため、防除は、開花始め～開花期に1回目、その7日後に2回目の薬剤散布を行う。

出荷製品に混入すると、人畜に有害なかび毒（デオキシニバレノール）を生産し、下痢や嘔吐などの中毒症状を起こす場合があるため、出荷できない。

## 2 収穫作業

### (1) ネバリゴシ

出穂後 46～50 日、出穂後積算温度 830～950℃、子実水分 20～30%を目安とする。

### (2) キタカミコムギ

出穂後 51～55 日、出穂後積算温度 900～1,000℃、子実水分 20～30%を目安とする。

穂発芽しやすいので、天候しだいでは水分 30%での刈取りが必要になる。この場合は速やかに乾燥機に張り込み、水分 25%までは送風温度を 40℃以下（乾減率は毎時 1.0%以下）にして品質低下を防ぐ

## りんご

良果を見極め、早期適正着果で高品質果実生産に努めよう！  
腐らん病は見つけ次第、適切な処置を！

ふじ（板柳町五幾形）の落花日は平年より 9 日早い 5 月 9 日であった。摘果は果実形質を見極めながら進め、できるだけ早い仕上げで高品質果実の生産に努める。

### ■ りんごの生育ステージ

板柳町五幾形 (月/日)

品種名	区分	発芽日	展葉日	開花日	満開日	落花日
ふじ	本年	3/24	4/ 6	4/27	5/ 2	5/ 9
	平年	4/ 8	4/18	5/ 8	5/13	5/18
	前年	4/ 9	4/13	5/ 4	5/ 7	5/13
	平年比	15日早	12日早	11日早	11日早	9日早
つがる	本年	3/24	4/ 6	4/27	5/ 1	5/ 7
	平年	4/ 6	4/19	5/ 7	5/12	5/17
	前年	4/ 8	4/13	5/ 3	5/ 5	5/12
	平年比	13日早	13日早	10日早	11日早	10日早
ジョナ ゴールド	本年	3/23	4/ 4	4/26	5/ 1	5/ 7
	平年	4/ 4	4/15	5/ 6	5/11	5/16
	前年	4/ 5	4/12	4/29	5/ 4	5/12
	平年比	12日早	11日早	10日早	10日早	9日早
王 林	本年	3/22	4/ 4	4/ 21	4/29	5/ 4
	平年	4/ 6	4/16	5/ 5	5/11	5/16
	前年	4/ 7	4/12	4/28	5/ 3	5/10
	平年比	15日早	12日早	14日早	12日早	12日早

## 1 摘 果

摘果が遅れると、玉伸びや果実品質、次年産の花芽形成にも影響を及ぼすので「早く」「強く」を心がけ、早期適正着果に努める。

なお、本年は開花期間中、天候不順だったため、園地や品種によってはカラマツの懸念があることから、自園地の結実状況を確認し、結実量不足が懸念される場合は、サビや変形のある果実も残す。

### ■ 標準的な着果程度

品 種	摘果の強さ (残す果実)	着果率 (%)
紅玉	3頂芽に1果	33
つがる・ジョナゴールド	3.5頂芽に1果	29
ふじ・王林・早生ふじ・トキ・シナノゴールド・きおう・金星 シナノスイート・未希ライフ・ぐんま名月・さんさ・春明21 星の金貨・千雪・夏緑・恋空・祝・花祝	4頂芽に1果	25
北斗	4.5頂芽に1果	22
陸奥・世界一	5頂芽に1果	20

## 2 病虫害防除

薬剤散布に当たっては、散布間隔と基準散布量を守り、散布予定日に降雨が予想される場合は前倒しで散布する。

また、近年、発生が多く経過している腐らん病は、薬剤による防除に加え、病斑の適切な処置で感染拡大を防ぐ。

### (1) 腐らん病対策

枝腐らんは、5～6月以降も発病してくるので、見つけ次第切り取り、適切に処分する。

胴腐らんは、処置が不十分であったり、誤った処置が行われている園地もみられるので、再発病斑を含め、次のいずれかの処置を適切に行う。

ア トップジンMオイルペーストを使う場合は、病患部を削り取り、薬液の浸透性を高めるために周囲の健全な表皮（上下約5cm、左右2～3cm）を薄く削ってから塗る。

イ フランカットスプレー又はバッチレートを使う場合は、周辺健全部を含めて病患部の上下約5cm、左右2～3cmを紡錘形にかつ切断面が直角になるよう削り取ってから薬剤を広く噴射又は塗布する。

ウ 泥巻きを行う場合は、水を加えて団子状にこねた泥を、病斑部よりも5～6cm広めに、3～5cmの厚さで貼り付ける。さらにその上をビニール又はポリエチレンフィルムなどで被覆し、内部の泥の乾燥を防ぐようにして約1年間そのままにしておく。病斑部を軽く削り取ってから泥巻きを行うと一層効果的である。

エ 胴腐らんの発病が著しい樹は、伝染源になるので積極的に伐採する。

### (2) 黒星病対策

殺菌剤無散布の県予察ほにおける葉の病斑は、平年より10日早い5月3日に確認されている。また、本年5月は平年より降水量が多く、感染リスクが高かった。

前年発生が見られなかった園地でも油断せず、自園地の状況を確認し、被害葉、被害果は見つけ次第摘み取り、適切に処分する。

## 特産果樹

### ◆ぶどう◆

スチューベンの開花は平年並の6月18日頃と予想される！  
摘梢は適期に行い、樹勢に応じた摘心を心がけよう！

スチューベン（鶴田町境）の展葉日は5月6日で、平年より4日早かった。

#### 1 新梢の誘引・結束

薬剤や日光の通りを良くするため、新梢は随時角度や間隔を調整しながら架線に誘引し、結束する。

#### 2 摘心（1回目）

1回目の摘心は開花7日前頃に行い、品種や樹勢に応じて強さを調整する。

品 種	摘心部	樹勢	副梢の取り扱い
スチューベン	第1花穂 上位5枚	強・中	①すべての副梢をかき取り、その後発生した先端の副梢を1本残す ②上位1本の副梢を残し、下位はかき取る ※①か②を選択する
		弱	上位2本の副梢を残し、下位はかき取る
シャインマスカット	第1花穂の 上位5枚		上位1本の副梢を残し、下位は1～2葉残して摘心する
キャンベル・アーリー	第1花穂の 上位3～4枚		上位2本の副梢を残し、下位はかき取る
サニールージュ	第1花穂の 上位5枚		上位1本の副梢を残し、下位はかき取る
ポートランド ナイアガラ	第1花穂の 上位4～5枚		上位2本の副梢を残し、下位はかき取る

#### 3 花穂の整形

花穂整形時期は、開花5日前頃から1～2花咲き始める時が適期である。

スチューベン、ポートランド、ナイアガラでは、花穂の岐肩（通称：カタ）のみを除去する。

キャンベル・アーリーでは、花穂の岐肩、岐肩下の長い支梗や軸の間隔が広いものを除去し、さらに花穂の先端も軽く切り詰める。

シャインマスカットは、岐肩と上部支梗を除去し、花穂の先端3.5～4cmを残す。花穂整形器を利用するとハサミに比べて整形作業時間が短縮される。

#### 4 シャインマスカットの無核栽培

シャインマスカットの無核栽培では無種子化を確実にするため、ストレプトマイシン処理を行ってからジベレリン及びフルメット処理を行う。

##### (1) ストレプトマイシン処理

満開予定日14日前～開花始期にストレプトマイシン200ppm溶液を花房に散布または浸漬する。

## (2) ジベレリン及びフルメット処理

### ア 無核3回処理の場合（ジベレリンは2回処理）

1回目は無種子化のために、満開時～満開3日後にジベレリン 25ppm 溶液に 5 ppm のフルメット液剤を加用した溶液に花房浸漬する。処理適期は、花穂先端まで花が咲ききったときである。

2回目は果粒肥大促進のために、満開 10～15 日後にジベレリン 25ppm 溶液に果房浸漬する。


### イ 無核2回処理の場合（ジベレリンは1回処理）

満開 3～5 日後（落花期）に、ジベレリン 25ppm 溶液に 10ppm のフルメット液剤を加用した溶液を花房浸漬する。

## 5 シャインマスカットの予備摘粒

### (1) 予備摘粒

無核3回処理の2回目（ジベレリン 25ppm＋フルメット液剤 5 ppm）処理日から 5～7 日後頃に、果房の軸長を 6 cm に調整する。その際、果房の内側（軸の方向）に向いた果粒を優先して摘粒し、小粒や障害果も摘粒する。軸長は、最上部2支梗（できるだけ対になるように残す）の基部から先端部（果梗は含めない）までの長さを計測して調整する（右図）。



### (2) 仕上げ摘粒

最上部2支梗の果粒は上向きも含めて各 4～5 粒残し、これ以下の支梗の果粒は果房形、果粒の配置を整えるため、外向きの果粒が等間隔となるように摘粒する。仕上げ摘粒により着粒数は 40 粒程度とする。

## 6 病害虫防除

### ■ 薬剤散布 【農業はぶどう園以外、他の作物、近隣の住宅等に飛散させない。】

#### <スチューベン>

散布時期 (10a 当たり散布量)	基準薬剤名と倍数			
	殺菌剤		殺虫剤	
開花10日前 6月上旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
	又はキノンドー水和剤40	600倍	又はパダンSG水溶剤	1,500倍
	又はインダーフロアブル	8,000倍	又はアグロスリン水和剤	2,000倍
	又はオンリーワンフロアブル	2,000倍	又はアディオンフロアブル	1,500倍
開花直前 6月中旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
	又はゲッター水和剤	1,500倍	又はパダンSG水溶剤	1,500倍
			又はジノテフラン剤※	2,000倍
落花直後 6月下旬 (250リットル)	ロブラール水和剤	1,500倍	アグロスリン水和剤	2,000倍
	又はポリベリン水和剤	1,000倍	又はアディオンフロアブル	1,500倍
	又はスイッチ顆粒水和剤	2,000倍	又はジノテフラン剤※	2,000倍
	又はフルピカフロアブル	2,000倍		

※ジノテフラン剤：スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤

- 注) 1 灰色かび病の発生が多い園地では、開花直前にゲッター水和剤を選択する。  
 2 べと病の発生が多い園地では、開花10日前にアリエッティC水和剤又はキノンドー水和剤40、開花直前にアリエッティC水和剤を選択し、落花直後にランマンフロアブル2,000倍又はライメイフロアブル4,000倍も使用する。  
 3 黒とう病の発生が多い園地では、開花直前にアリエッティC水和剤、落花直後にポリベリン水和剤を選択する。

#### <シャインマスカット（露地栽培）>

散布時期 (10a 当たり散布量)	基準薬剤名と倍数			
	殺菌剤		殺虫剤	
新梢伸長期 (約30cm) 6月上旬 (200リットル)	ジマンダイセン水和剤	1,000倍		
	又はインダーフロアブル	8,000倍		
	又はオンリーワンフロアブル	2,000倍		
開花10日前 6月中旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
			又はパダンSG水溶剤	1,500倍
			又はアディオンフロアブル	1,500倍
			又はアグロスリン水和剤	2,000倍
開花直前 6月下旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
			又はパダンSG水溶剤	1,500倍
			又はジノテフラン剤※	2,000倍
落花直後 7月上旬 (250リットル)	ロブラール水和剤	1,500倍	アグロスリン水和剤	2,000倍
			又はアディオンフロアブル	1,500倍
			又はジノテフラン剤※	2,000倍

※ジノテフラン剤：スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤

- 注) べと病の発生が多い園地では、落花直後にランマンフロアブル2,000倍又はライメイフロアブル4,000倍も使用する。



## ◆おとう◆

満開日が早かったため、収穫時期も早まると予想される！  
適期管理と適期防除で品質向上に努めよう！

佐藤錦（鶴田町菖蒲川）の満開日は4月26日で平年より9日早く、落花日は5月8日で平年より7日早かった。

### 1 裂果防止対策

雨よけハウスの被覆は着色した果実が見え始めた頃に行い、裂果防止に努める。

### 2 着色管理

#### (1) 葉摘み

果実の着色がある程度進んだ頃（おおむね収穫予定の7～10日前頃）から行い、果実に直接かぶさっている葉を軽く摘み取る。過度の葉摘みは果実品質を低下させたり、翌年の花芽の充実不足、樹勢の低下を招くおそれがあるので、**摘み取る量は最小限にとどめる。**

#### (2) サンキャッチ液剤30Sの利用

着色促進のためサンキャッチ液剤30Sを利用する場合は、以下により使用する。

##### ■ サンキャッチ液剤30Sの使用法

対象品種	佐藤錦、南陽
処理方法	600倍液を立木全面散布
処理時期	収穫開始14日前(着色が樹全体の2～3割頃)と7日前の2回
散布量	300リットル/10a

- 注) 1 散布直後の降雨は効果を減じるので、晴天日に散布する。  
2 樹冠内部が暗いと効果が劣るので、樹冠内部の明るさを適正に保つ。  
3 展着剤は不要である。  
4 他の薬剤と混用せず、単用で用いる。

## 農薬適正使用と隣接農地への飛散防止に十分気をつけましょう！

- 使い残した農薬などは、河川等へ絶対捨てない。
- 農薬を使用する場合には、必ず最新の「農薬登録情報」を確認しましょう。
- 農薬は鍵のかかる専用の場所に保管し、管理を徹底しましょう。

### 3 病害虫防除

#### ■薬剤散布【農業はおうとう園以外、他の作物、近隣の住宅等に飛散させない。】

散布時期 (10a 当たり散布量)	基準薬剤名と倍数			
	殺菌剤		殺虫剤	
満開35日後 6月上旬 (500リットル)	アミスター10フロアブル	1,000倍	テルスターフロアブル	4,000倍
	又はファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	又はエクシレルSE	2,500倍
	又はナリアWDG	2,000倍	又はテッパン液剤	2,000倍
	又はアンビルフロアブル	1,000倍		
	又はオンリーワンフロアブル	2,000倍		
収穫前 【佐藤錦】 6月中～下旬 (500リットル)	アミスター10フロアブル	1,000倍	スカウトフロアブル	3,000倍
	又はナリアWDG	2,000倍	又はエクシレルSE	2,500倍
	又はインダーフロアブル	5,000倍		
収穫前 【晩生種】 7月上旬 (500リットル)	アミスター10フロアブル	1,000倍	スカウトフロアブル	3,000倍
	又はナリアWDG	2,000倍	又はテルスターフロアブル	4,000倍
			又はエクシレルSE	2,500倍
			又はテッパン液剤	2,000倍
			又はスピノシン剤※	10,000倍

※スピノシン剤：ディアナWDG、デリゲートWDG

- 注) 1 満開35日後頃に、紅さやかなどの早生種に散布する場合、収穫前日数に注意して薬剤を選択する。
- 2 カメムシ類対策では、満開35日後に発生がみられた場合は、テルスターフロアブルを選択する。
- 3 収穫前にオウトウショウジョウバエ対策でスカウトフロアブルを使用するとカメムシ類防除剤は必要ない。
- 4 アンビルフロアブル、オンリーワンフロアブル、インダーフロアブルは、薬剤耐性の懸念があるので連続使用しない。
- 5 アミスター10フロアブル、ファンタジスタ顆粒水和剤、ナリアWDGは、薬剤耐性の懸念があるので、合わせて年2回以内の使用とする。ただし、アミスター10フロアブルとファンタジスタ顆粒水和剤は連続使用しない。

### 4 収穫

収穫は満開日からの日数が目安になるが、天候によっては早まることもあるので、品種の特性（着色、大きさ、形状、食味など）を重視し、成熟したものから順次、数回にわたって行う。

#### ■各品種の収穫期の目安

品 種	満開日から収穫日までの日数
紅さやか	40～50日
佐藤錦	50～55日
ジュノハート	55～60日
紅秀峰	60～70日
サミット	60～65日
南陽	60～65日

## 野菜

こまめな温度管理や草勢に応じた肥培管理、適期防除を行いましょう！

### ◆トマト◆

#### 1 温度管理

- (1) ハウスの温度は昼間 25℃前後で管理する。天候により高温障害が発生しないよう、サイド換気や肩換気を行う。
- (2) 気温が低い日や夜間はサイドを閉め、保温に努めるが、6月中旬以降、最低気温が 14℃以上になれば、夜間もサイドを開放する。

#### 2 着果促進

- (1) 1～4段花房は4番花開花始め、5段花房以降は3～4番花開花始めにトマトトーン処理をする。処理はなるべく気温が高温にならない午前中の時間帯に行う。

#### 3 かん水・追肥

- (1) 本格的なかん水・追肥は、1本仕立て苗は3段花房の開花始めから、2本仕立て苗は2段花房の開花始めから行う。
- (2) かん水量は1株当たり 1.5 リットルを基準とし、28℃以上の気温が予想される日は1株当たり 2リットルとする。2本仕立て苗は側枝1本を1株と換算し、1株当たりのかん水量は1本仕立て苗の2倍量とする。
- (3) かん水の間隔は天候状態をみながら、毎日～2日おきで調整する。
- (4) 1回当たりの追肥量は、窒素成分 0.5kg/10a 以内とする。10日間の窒素成分の合計は 1.5～2.5kg/10a を目安とするが、天候状態や草勢に応じて調整する。

<かん水と追肥量の目安> ( )は2本仕立て苗

月	旬	かん水量/1株当	かん水間隔	10日間の窒素成分合計
6	上	1.5 <sup>リットル</sup> (3.0 <sup>リットル</sup> )	1～2日おき	1.5～2.0kg/10a
	中～下	1.5～2.0 <sup>リットル</sup> (3.0～4.0 <sup>リットル</sup> )	毎日～1日おき	2.0～2.5kg/10a

#### 4 摘果

3段花房トマトトーン処理後に、1段果房を一斉に摘果する。奇数段は3果、偶数段は4果になるよう摘果する。

#### 5 葉面散布

草勢の維持（葉先枯れ、ガク枯れ、着果不良軽減）のため、3段開花以降、メリット黄 400 倍を各段 2～3 日おきに 2 回、開花花房を中心に葉面散布する。

#### 6 病虫害防除

- (1) 灰色かび病が発生しやすくなるので、葉先枯れ部分や花カスをできるだけ取り除き、ハウス内の換気や薬剤による予防防除を行う。
- (2) アザミウマ類の発生が多くなるので、ほ場周辺の除草を行い、発生状況に応じて早期に防除を行う。

## ◆メロン◆

### 1 温度管理

定植後は最高気温 28～30℃、開花期は最低気温 12～15℃を目安に、トンネルの開閉などでこまめな温度・湿度管理を行う。特に夜間の閉めきりは軟弱徒長となり、病虫害の発生の原因となるので、こまめな開閉を心がける。（外気の最低気温 15℃以上なら夜間開放）

### 2 かん水

開花期のかん水は、湿度の上昇により花粉が出にくくなるので控える。

着果確認後（鶏卵大の頃）から着果2週間後頃までかん水を行う。1回の量は、株当たり 4リットルが目安となるが、土壌水分により加減する。

草勢（つる先の立ち上がり、葉色、孫づるの伸長）を見て、液肥や葉面散布を行う。

### 3 摘心と整枝

#### (1) 結果枝（孫づる）の摘心

ア 弱勢の場合 着果節位を1～2節上げ、着果確認後に、孫づるの葉1枚を残し、摘心する。

イ 適勢の場合 開花前後に孫づるの葉1枚を残し摘心する。

ウ 強勢の場合 開花予定日の3～4日前に孫づるの葉1枚を残し、摘心する。

#### (2) 結果枝以外の整枝

22～23節で子づるを摘心する。15～20節の孫づるを除去する。

整枝は着果後10日までに終了し、風通しを良くし、ネットの形成を促進する。

果実肥大期は、受光体勢を維持するため、茎・葉を動かさないようにする。

## 花 き

適正な温度管理により高品質な花きの生産に努めよう！

## ◆キ ク◆

### 1 定植前後の管理

採穂に当たっては、病虫害に侵されておらず、太さが揃い充実したものを選択し、定植2週間前から挿し芽を行う。10月出荷の作型は、6月上旬～下旬に定植できるように作業を進める。

挿し芽後は十分かん水する。6月以降の日射が強い時期は、遮光率50%程度の資材を発根まで被覆して日中のしおれを防ぐ。

定植後の管理について、花芽分化期までにはいかに草丈を伸ばすかが、良品切り花生産にとって重要であるので、定植後40日くらいは十分にかん水する。なお、温度は、日中 25℃、夜間 15℃を目標に管理する。

## 2 病害虫防除

白さび病、アブラムシ類、アザミウマ類及びハモグリバエ類が発生しやすい時期なので、過湿や多肥を避け、早期発見・早期防除に努める。また、ヤガ類の侵入を防ぐため、ハウスのサイドや出入口等に目の大きさが4mm以下の防虫ネットを早めに設置する。

## ◆トルコギキョウ◆

### 1 定植作業

10月出荷の作型では、6月下旬頃までに定植する。老化苗は生育が劣るので、本葉が4枚展開までのものを使用する。

高温時の定植では、定植1週間前から遮光率40%程度の遮光資材を用いて地温を下げおき、活着を確認したら曇天または夕方に被覆資材を除去する。

定植は深植えとせず、株元を強く押さえないようにする。

### 2 定植後の管理

気温25℃以上が続くと生育の停滞やロゼットの要因となるので、遮光や換気等で温度管理を徹底し、発らいまでは乾燥させないように管理する。日中の気温が25℃以上になった場合は夜間もハウスを十分に開放し、夜温を15℃以下にする。

分枝が低節位から発生した場合は、主茎促進のため、5節まで（草丈15cmまで）のものを早めに摘み取る。

### 3 病害虫防除

上記キクを参照

### 登録品種に関する注意喚起

- 登録品種の種苗・収穫物等を利用するには、原則として権利者の許可が必要です。
  - ・育成権者の許可を得ずに、自家採取した登録品種の種苗を近所の農家等に配布することは種苗法に違反します。
  - ・他都道府県で開発された品種によっては、作付けできる都道府県が限定されている場合があります。
- 登録品種かどうかの確認は品種登録ホームページ (<http://www.hinshu2.maff.go.jp>) で行い、正規のルートで種苗を入手しましょう。
- 育成権者を侵害すると民事請求を受けたり、刑事罰を科される場合があります。