

家畜衛生情報 No.2 令和元年5月27日



西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所

津軽地区家畜衛生推進協議会

つがる市木造若竹 2-1

TEL 0173-42-2276

FAX 0173-42-6087

豚コレラ対策の徹底をお願いします！



農林水産省から、国内 13 例目から 22 例目までの豚コレラ感染経路等の調査結果が示されました。

概要

① 発生時期よりも 1~2 か月前にウイルスが侵入していたと推定された。

例 3月29日に発生した16例目のウイルス侵入時期は1月中旬から2月上旬と推定された。

② 臨床症状が乏しい。

例 3月28日に発生した14例目の通報内容は「分娩舎で複数等の**食欲不振**の豚がいる」というものであった。

③ 小動物や野生動物を介して豚舎内にウイルスが侵入した可能性がある。

例 豚舎内にネズミ、農場内にネコやカラスが認められた。



④ 周辺で発生した農場のウイルスが原因となっている可能性がある。

例 愛知県の養豚密集地域の発生事例では、ウイルスが付着している可能性のあるネズミ、ハエ等が周辺にウイルスを運搬した可能性がある。

今一度、発生予防対策の見直しをお願いします

⚠ 飼養者が立ち入る頻度の高い分娩舎等では…

- ✓ 踏込消毒や専用の長ぐつの使用
- ✓ 立入前の手洗い
- ✓ ていねいな個体ごとの臨床観察



⚠ 豚コレラを疑う症状が認められたときの早期通報

特定症状と思われる症状を発見したときは、速やかに家畜保健衛生所へ通報をお願いします。

特定症状については裏面をご確認ください



つがる家畜保健衛生所 0173-42-2276
土日休日緊急用携帯 090-8788-7459

裏面へ

豚コレラの特定期状

- ① 耳翼、下腹部、四肢等に**紫斑**
- ② 以下のいずれかの症状を示す豚が1週間ほどの間に増加していること。
 - (1) 40℃以上の発熱、元氣消失、食欲減退
 - (2) 便秘、下痢
 - (3) 結膜炎（目やに）
 - (4) 歩行困難、後軀麻痺、けいれん
 - (5) 削瘦、被毛粗剛、発育不良（いわゆる「ひね豚」）
 - (6) 死流産等の異常産の発生
 - (7) 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便
- ③ 同一の畜舎内において、一週間ほどの間に複数の繁殖又は肥育豚等が**突然死亡**すること。



写真出典：岐阜県

豚コレラは特徴的な症状を示さない場合があります。気づきにくい疾病です。
異状を発見したら直ちに通報しましょう！

毎週月曜日には、家畜衛生対策の点検を行いましょう！

つがる家畜保健衛生所（平日8：30～17：15）0173-42-2276

緊急用携帯（平日17：15以降、土日祝日）090-8788-7459