

# 家畜衛生情報 No.18 令和2年11月12日




西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所  
津軽地区家畜衛生推進協議会

つがる市木造若竹2-1 TEL 0173-42-2276 FAX 0173-42-6087



## 国内で高病原性鳥インフルエンザの発生が続発しています



令和2年11月5日、8日及び11日に香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。

1例目	香川県三豊市	採卵鶏	約33万羽 (H5N8亜型)
2例目	香川県東かがわ市	採卵鶏	約4.8万羽 (H5N8亜型)
3例目	香川県三豊市	肉用種鶏	約1.1万羽 (H5亜型)

### 農場への鳥インフルエンザ侵入防止チェックポイント

#### 関係者以外の農場への立入り制限

・これらの記録はありますか？

#### 出入りする人・車両・物等の消毒徹底

・適正な消毒薬を用いた消毒がされていますか？

#### 鶏舎壁や防鳥ネットの破損確認

・壁の穴をふさいだり網を2重に張るなどの対応を速やかに

#### 鶏舎周囲のチェック

・鶏舎周囲に物が散乱し、野生動物の隠れ家になっていませんか？

#### 鶏舎の清掃・消毒

・鶏舎周囲に石灰帯を作りましょう

・鶏舎専用の衣類・履物を準備しましょう

・鶏舎入口に踏込消毒槽を設置しましょう

・踏込消毒槽の適正なものを選択し、汚れたら交換しましょう

※ビルコン等の塩素系消毒薬は石灰と混ざると効果が弱まることがあるので注意が必要です。



## 次のような症状を見られたら速やかに家畜保健衛生所へ

- \* 急激に死亡する鶏の数が増えた
- \* 過去3週間の死亡率と比べて、死亡率が2倍以上になった
- \* 5羽以上まとまって死亡している
- \* まとまって嗜眠・沈うつ状態になっている(写真1・2)
- \* 皮下出血がある(写真3)
- \* トサカや肉垂が暗青色に変化した(写真4)
- \* 急激に産卵率が低下した



写真 1. 感染し、元気をなくした鶏 (真瀬昌司原図)



写真 2. 突然の沈うつ、すぐ死亡 (山口県提供)



写真 3. 脚部の皮下出血 (真瀬昌司・谷村信彦原図)



写真 4. 宮崎株実験染鳥 肉垂のチアノーゼが見られる (動物衛生研究所提供)

### 写真出典

平成27年9月9日 農林水産大臣公表

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針 参考資料

つがる家畜保健衛生所(平日 8:30~17:15) 0173-42-2276  
緊急用携帯(平日 17:15 以降、土日祝日) 090-8788-7459

# 予防対策の重要ポイント

## 【衛生管理区域】

### 家きん舎



車両消毒



消毒の実施



専用の服や靴の使用



壁や金網の破損修繕

集卵・除糞ベルトの  
開口部の隙間対策

家きん舎周囲の整理・  
整頓(樹木の剪定等)



野鳥飛来防止対策  
(忌避テープを張るなど)

水辺



鶏舎周囲の池の  
水抜き

## ①人・物・車両によるウイルスの持込み防止

- ・衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗淨・消毒の徹底
- ・衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・上記措置の記録

## ②野生動物対策

- ・防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕
- ・家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・上記措置の定期点検

## 周辺に水辺のある農場は

### ①、②の予防対策を徹底

(リスクを減らす取組(季節を限って水を抜く、野鳥を寄せ付けないよう忌避テープを張るなど)が効果的)