

★青森県三八農林水産事務所ハ戸家畜保健衛生所

★県南地区家畜衛生推進協議会

韓国で口蹄疫が発生！

韓国では、2026年1月に9ヶ月ぶりに牛で口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。発生予防の徹底をお願いします！


韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）

発生日	場所	動物種	飼養頭数
1 '25/3/13	全南	牛	184
2 '25/3/14	全南	牛	15
3* '25/3/14	全南	牛	471
4 '25/3/14	全南	牛	31
5 '25/3/15	務安郡	牛	88
6 '25/3/17	全南	牛	365
7 '25/3/17	全南	牛	25
8 '25/3/17	全南	牛	100
9 '25/3/18	全南	牛	49
10 '25/3/18	全南	牛	25
11 '25/3/19	全南	牛	125
12 '25/3/19	全南	牛	835
13 '25/3/20	全南	牛	43
14 '25/3/23	全南	牛	31
15 '25/4/10	全南	豚	5,223
16 '25/4/10	全南	豚	1,736
17 '25/4/12	全南	豚	1,951
18 '25/4/12	全南	豚	1,931
19 '25/4/13	全南	豚	3,216
20 '26/1/30	仁川 江華郡	牛	246

*関連農場 2農場（いずれも検査陽性）あり。

出典：韓国農林畜産食品部、WOAH

2026年2月2日時点
農林水産省動物衛生課



注：日付はWOAH報告の発生日
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴に履き替えるか踏込消毒槽等を設置し、出入りする人の靴底の消毒を徹底**しましょう。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- 毎日、飼養家畜の**健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- 畜舎ごとに専用の長靴または踏込消毒を設置し、使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。また、水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけではなく、泥よけの内側部分まで消毒し、衛生管理区域内で降車する場合は農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒を実施しましょう。



汚れをしっかり落としてから消毒



タイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

《要注意》

- 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！
- 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを流したり、口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）ができるのが特徴です。

～牛の症状～

写真：宮崎県提供



上顎口唇潰瘍



水疱が破れている

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

1頭のみに着目せず、症状を示している牛の数や症状の急速な拡がりなど、農場全体としての異状の有無を確認しましょう！

★青森県三八農林水産事務所ハ戸家畜保健衛生所

★県南地区家畜衛生推進協議会

韓国で口蹄疫が発生！

韓国では、2026年1月に9ヶ月ぶりに牛で口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いている。発生予防の徹底をお願いします！


韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）

発生日	場所	動物種	飼養頭数
1 '25/3/13	全南	牛	184
2 '25/3/14	全南	牛	15
3* '25/3/14	全南	牛	471
4 '25/3/14	全南	牛	31
5 '25/3/15	務安郡	牛	88
6 '25/3/17	全南	牛	365
7 '25/3/17	全南	牛	25
8 '25/3/17	全南	牛	100
9 '25/3/18	全南	牛	49
10 '25/3/18	全南	牛	25
11 '25/3/19	全南	牛	125
12 '25/3/19	全南	牛	835
13 '25/3/20	全南	牛	43
14 '25/3/23	全南	牛	31
15 '25/4/10	全南	豚	5,223
16 '25/4/10	全南	豚	1,736
17 '25/4/12	全南	豚	1,951
18 '25/4/12	全南	豚	1,931
19 '25/4/13	全南	豚	3,216
20 '26/1/30	仁川 江華郡	牛	246

*関連農場 2農場（いずれも検査陽性）あり。

出典：韓国農林畜産食品部、WOAH

2026年2月2日時点
農林水産省動物衛生課



注：日付はWOAH報告の発生日
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴に履き替えるか踏込消毒槽等を設置し、出入りする人の靴底の消毒を徹底**しましょう。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- 畜舎ごとに専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗浄・消毒しましょう。踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。また、水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、泥よけの内側部分まで消毒し、衛生管理区域内で降車する場合に農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒を実施しましょう。



汚れをしっかり落としてから消毒



タイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

≪要注意≫

- 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！
- 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを流したり、口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。