

農作物生産情報 (令和6年8月)

気象

(令和6年7月25日 仙台管区気象台発表 東北地方1か月予報より)

向こう1か月の天候は、平年と同様に晴れの日が多い。

気温は、平均気温が高い確率60%で、特に期間の前半は、かなり高くなる見込みである。

降水量は、平年並又は多い確率ともに40%である。

日照時間は、平年並の確率40%で、多い確率及び少ない確率30%である。

水稲

根の活力を維持する水管理をしよう！
斑点米カメムシ類と穂いもちの適期防除を徹底しよう！

1 生育概況

管内生育観測ほの幼穂形成期は、「まっしぐら」は7月7日（平年より2日早い）、
「はれわたり」は7月7日（前年より3日遅い）、「青天の霹靂」は7月7日（平年より
1日早い）であった。

今後、気温が平年並に推移した場合、生育の早い地点では、「まっしぐら」は7月28
日頃、「はれわたり」は7月29日頃、「青天の霹靂」は7月28日頃に出穂期（ほ場全
体で50%が出穂した時期）になると見込まれる。

■ 管内生育観測ほ等の幼穂形成期到達状況と出穂期の見込み

品種名	幼穂形成期	出穂期の見込み
まっしぐら	7月5日～14日	7月28日～8月6日
はれわたり	7月6日～12日	7月29日～8月4日
青天の霹靂	7月4日～11日	7月28日～8月4日

注) 1 幼穂形成期～出穂期の日数は、生育観測ほ平均で「まっしぐら」が23日間、
「はれわたり」が23日間、「青天の霹靂」が24日間である。出穂期の見込み
は今年度の幼穂形成期に所定の日数を加算して算出した。

2 高温で推移した場合、出穂期の見込みはさらに早まる可能性がある。

2 水管理

高温時には水の入れ替えや間断かんがい等を行い、根の活力を維持する。

■ これからの水管理

生育期	暑い日	寒い日	備考
出穂開花期	水深5～6cm程度 時々水の入替え	(最高気温25℃以下) 水深10cm	イネが最も水を必要とする時期
登熟期	水深2～3cm程度 間断かんがい または飽水管理※	(最低気温15℃以下) 水深10cm以上	台風時は脱水症状防止のため水深6cm前後
落水時期	【青天の霹靂】の場合 出穂後30～35日目 【まっしぐら・はれわたり】の場合 湿田では出穂後20～25日目 乾田では出穂後30～35日目		落水が早すぎると収量・品質が低下

※「飽水管理」：水尻を止水して自然減水し、溝や足跡に水がたまっている箇所が散見される状態になったらかん水する、を繰り返す管理のこと。

3 病害虫防除

(1) 斑点米カメムシ類

ア 残効性の高い薬剤を使用する場合

残効性の高い薬剤を使用する1回散布体系の場合は、穂揃期（80%の穂が出穂した時期）～穂揃14日後に散布する。

イ その他の薬剤を使用する場合

2回散布体系の場合は、1回目を穂揃期、2回目を穂揃期の7～10日後に薬剤を散布する。

ウ ア及びイのいずれの防除体系でも、例年斑点米の発生が多い水田や病害虫発生予報等で多発生が予想される場合、最終散布の7～10日後に追加防除を行う。

エ 畦畔の草刈りは出穂7日前までに終わることが基本だが、やむなく出穂後に草刈りを行う場合は薬剤散布後速やかに行う。

(2) 穂いもち

出穂直前（走り穂が見えた時期）と穂揃期の2回散布を徹底する。葉いもちの発生が多いなど多発生が予想される場合には、穂揃期5～7日後にも薬剤散布を行う。

(3) 紋枯病

前年の菌核が伝染源であるため、前年に発生が多かったほ場では、出穂直前に茎葉散布を行う。

○ 「青天の霹靂」は使用できる農薬成分回数が市町・JAで異なります。農薬散布の際には必ず確認しましょう。

○ 農薬を使用する際には、使用回数・使用時期等を確認しましょう。

畑 作

◆大豆◆

病虫害防除をしっかりと行おう！

1 雑草防除

中耕及び除草剤で除草しきれなかった雑草は、手取りする。

2 病虫害防除

(1) 開花期前後（8月上旬）

アブラムシや食葉害虫の発生が多いほ場では防除する。

(2) マメシクイガ（8月下旬～9月上旬）

連作で発生が多くなる。

8月第6半旬～9月第1半旬に1回防除を行う。合成ピレスロイド剤は一定の残効期間があるが、莢に食入した幼虫には効果がない。有機リン剤は残効期間が短い、莢に食入した幼虫にもやや効果がある。

なお、多発ほ場の発生時期は早まる傾向があり発生のピークが8月第3～4半旬になるので、無人航空機散布では、1回目防除を8月第4半旬にプレバソンプロアブル5で、2回目防除を8月第6半旬にプレバソンプロアブル5または他薬剤で行う。

(3) 紫斑病

紫斑病は、開花期後20～40日の間に防除を行う。

チオファネートメチル剤、ベノミル剤、アゾキシストロビン剤を散布しても紫斑粒の混入が目立ったほ場では、これらの薬剤の使用を中止し、別の薬剤に切り替える。

耐性菌の新たな発生や発生地域の拡大を回避するため、同一系統剤の連年使用を避ける。

3 追肥

追肥を予定している場合は、開花期に窒素成分で10a当たり5～8kg追肥する。ただし、茎葉が過繁茂で倒伏のおそれがある場合は行わない。

4 水管理、排水対策

開花後から子実肥大の初期は、過湿、過乾燥の影響を強く受ける時期である。

この時期の水分ストレスがしわ粒の原因になるので、排水対策と合わせ、水分不足にならないよう管理を徹底する。

りんご

見直し摘果の徹底で、ワンランク上の果実を生産しよう！
果実の熟度に注意して、適期に作業しよう！

県生育観測ほ（板柳町五幾形）のふじの果実肥大は、7月21日現在、横径6.6cmで平年よりも12mm上回っている（平年比122%）。そのほかの地点でも7mm程度上回っている。

7月9～10日に行った着果状況調査では、西北地域15地点の平均でいずれの品種も標準着果率（ふじ・王林・トキ：25%、つがる・ジョナゴールド：29%）を上回り、特につがるでさび果が目立っているため、見直し摘果を徹底する。

1 見直し摘果

仕上げ摘果が終了した園地でも、見落としや過着果の部分がないか、もう一度園地を見回り、見直し摘果を行う。見直しに当たっては、病害虫被害果やさび果、形質不良な果実などを優先して摘果する。

なお、摘み取った病害虫被害果は、適切に処分する。

2 徒長枝の整理、支柱入れ及び枝つり

病害虫の発生源を少なくし、薬剤の到達と日光の透過をよくするために、不要な徒長枝は切り取る。

また、果実が大きくなるにつれて枝が下がり、重なり合ってくるので、支柱入れや枝つりを行う。

なお、果実の日焼けを防ぐため、高温・晴天が続く場合は、徒長枝の整理、支柱入れ、枝つりなどは控える。

3 病害虫防除

散布予定日に降雨が予想される場合には、事前散布に徹する。なお、薬剤の散布に当たっては、収穫前日数や年間使用回数などに注意する。

■ 薬剤散布（県りんご防除暦より抜粋）

散布時期	対象病害虫	基準薬剤
8月半ば	斑点落葉病	アリエッティC水和剤 800倍
	炭疽病	又はダイパワー水和剤 1,000倍
	ハダニ類	又はベフラン液剤25 1,500倍
	モモシンクイガ	
8月末	斑点落葉病	アリエッティC水和剤 800倍
	炭疽病	又はダイパワー水和剤 1,000倍
	ハダニ類	又はベフラン液剤25 1,500倍
	モモシンクイガ	

注) 1 ベフラン液剤25及びアリエッティC水和剤は、他薬剤と組み合わせる場合、最後に調合する。

2 炭疽病の発生が多い所や多発が心配される場合は、ベフラン液剤25を選択し、オーソサイド水和剤80 800倍を加用する。

3 褐斑病の多発条件下では、アリエッティC水和剤は使用しない。

(1) 腐らん病

本年も、腐らん病の発生が目立っている。枝腐らんは、見つけ次第切り取り、適切に処分する。

胴腐らんは、処置が不十分であったり、誤った処置が行われている園地もみられるので、再発病斑を含め、削り取り法か泥巻き法のいずれかの処置を適切に行う。胴腐らんの発病が著しい樹は、伝染源になるので積極的に伐採し、速やかに園外へ搬出する。

(2) 黒星病及び褐斑病

秋期や翌年以降の感染源を減らすために、被害葉や被害果は、見つけ次第摘み取り適切に処分する。

(3) 斑点落葉病

急増の恐れがある場合は、ポリオキシシ A L 水和剤 1,000 倍も使用する。

(4) モモシンクイガ

無袋栽培では毎回モモシンクイガの防除剤を使用する。被害果は見つけ次第摘み取り、7日間以上水に漬けるか、土中深く（10cm以上）埋めるなど適切に処分する。



(5) ハダニ類

急増しやすい時期なので、発生が見られる場合は殺ダニ剤を使用する。なお、殺ダニ剤は薬剤抵抗性が出やすいので、同一薬剤は年1回の使用にとどめる。

(6) リンゴコカクモンハマキ

8月以降、発生が多い場合は、果実に接触している葉を早めに摘み取る。

(7) クワコナカイガラムシ

発生が多い樹では、8月上旬に防除剤による胴木洗いを実施する。また、誘殺用のバンドを8月中旬の第1世代成虫の産卵前までに巻き付ける。

4 収穫前落果の防止

収穫前落果が多い「つがる」や「きおう」は、いずれかの落果防止剤を散布する。

開花が早まったことから、果実の熟度も早まる可能性が高いため、熟度調査結果に注意し、熟度に合わせて適期に散布する。

(1) 「ストップボール液剤」の使い方

品 種	散 布 時 期	回数	倍 数	散布量
未希ライフ き お う	収穫開始予定日の20～15日前 (平年：8月10～15日頃)	1回	1,000倍	350～400 ^{リットル} ／10a
つ が る	収穫開始予定日の25日前 (平年：8月15～20日頃)			

- 注) 1 単用散布（展着剤不用）とする。
 2 散布後7日間は収穫できない。
 3 「未希ライフ」、「きおう」に対して早期散布すると、つる割れの発生や果肉の軟化など、品質低下を招いた事例があるので、基準以外の使い方をしない。
 4 「つがる」に対して、伸長中の新梢の先端部枝葉に薬害が出ることがあるので、高温時（28℃以上）の散布は行わない。
 5 果実の熟度を進ませる傾向があるので、収穫や販売を遅らせない。
 6 「つがる」に対して、本剤の2回散布や早出しを目的とした極端な早期散

布、着色促進剤等との併用を行うと、果実の軟化や油上がりが著しく早まるほか、年によって裂果やつる元の腐敗が多く見られるので、上表以外の使い方はしない。

- 7 散布により、果実の軟化が発生する場合がありますので、収穫前落果の少ない品種には使用しない。
- 8 葉から吸収されて効果を出すので、葉に十分かかるようにする。
- 9 葉摘みは散布4～5日後から始める。

(2) 「ヒオモン水溶剤」の使い方

品 種	散 布 時 期	回 数	倍 数	散 布 量
き お う	収穫開始予定日の21日前 (平年：8月10～15日頃)	1 回	2,000倍	300～600 ^{リットル} ／10 a
つ が る	収穫開始予定日の21日前 (平年：8月20～25日頃)			

- 注) 1 単用散布（展着剤不用）とする。
 2 散布後4日間は収穫できない。
 3 散布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見極めてから散布する。
 4 高温時の散布は避ける。
 5 薬液が葉先からしたたり始める程度にむらなく、樹全体にていねいに散布する。
 6 葉摘みは散布当日から始めてもよい。
 7 果実の熟度や日持ち性は無処理の果実と同等である。

5 乾燥対策

苗木や若木は乾燥の影響を受け易いので、園地の状況を把握し、干天日（降水量5mm未満）が2週間程度続いたら、1㎡当たり200程度をかん水する。

また、草からの蒸散を防ぐため、草刈りをこまめに行い、樹冠下に敷き草する。

6 風害防止対策

台風等に備え、防風網やわい性台樹の結束などについて、再度点検し、補強や取り替えを行う。また、幹や主枝などに空洞が生じている樹や、腐らん病の被害等を受けた枝や樹は、支柱で支え、縄などで補強する。幼木は倒伏しやすいので支柱を立てて結束する。

7 日焼け防止対策

果面温度の上昇防止や光を遮るために、物理的に日射を遮ることが最も有効である。真夏日や猛暑日が続くと予想される場合には、遮光資材による被覆を行って、日焼けの軽減を図る。

遮光資材は遮光率10～20%程度のものを使用し、日焼けの可能性がなくなり次第取り外す。

特産果樹

◆ぶどう◆

良品生産に向け、適期に適正な管理を行おう！

1 スチューベンの摘房


着色不良果（赤目）防止や房枯れ症状予防のため、遅くとも着色始め頃（例年では8月中～下旬）までに再度着房数を点検し、摘房を終える。また、支梗単位での切除や摘粒を行い、適正な大きさの果房に整える。

■ 着房の日安

結果枝の葉数	着房程度
葉数が13枚以下	成らせない
〃 14～18枚	1房
〃 20枚前後	1～2房
〃 25枚以上	2房

2 シャインマスカットの摘粒

果粒軟化期（例年では7月下旬～8月上旬頃）前には終えるようにする。小粒果やさび果などの障害果のほか、果粒が外向きに並ぶように内側の果粒を除去し、目安の果粒数（40粒程度）にする。



■ 摘粒前と摘粒後のシャインマスカット

（左：摘粒前（61粒）、右：摘粒後（45粒））

3 シャインマスカットの袋かけ

袋かけは摘粒後、果粒軟化期頃（例年は7月下旬～8月上旬）に行うが、気温が30℃を超える極端に高温な日や時間帯には日焼けするので行わない。袋かけ前には必ず薬剤防除を行い、袋は収穫時まではずさない。

4 新梢（結果枝）の管理

新梢が徒長している園地では、随時摘心を行い過繁茂防止に努める。また、新梢の基部まで十分日光が当たるように誘引する。

5 病害虫防除

散布予定日に降雨が予想される場合には、事前散布に徹する。なお、薬剤の散布に当たっては、収穫前日数や年間使用回数などに注意する。

■ スチューベンの薬剤散布

散布時期	対象病害虫	基準薬剤	
8月上旬	晩腐病	アミスター10フロアブル	1,000倍
	べと病	又はストロビードライフロアブル	2,000倍
	灰色かび病	又はホライズンドライフロアブル	2,500倍

- 注) 1 この時期の散布は、果面汚染防止のため展着剤を使用しない。
 2 ホライズンドライフロアブルは、灰色かび病対策で使用しない。
 3 晩腐病対策
 発病果粒や発病果房は見つけ次第摘み取って、土中深く埋めるなどの処分をする。また、園地内の排水や通風を良くし、過湿にならないようにする。
 4 べと病対策
 被害葉・果房は見つけ次第摘み取り、処分する。また、排水対策、薬剤散布など防除対策を徹底する。
 スチューベンでは秋季に葉での発生が多い園地を対象に、「8月中旬」にレーバスフロアブル3,000倍を特別散布する。
 5 灰色かび病対策
 長期貯蔵向けでは、「8月下旬」から「9月上旬」にフルーツセイバー1,500倍を特別散布する。

■ シャインマスカットの薬剤散布

散布時期	対象病害虫	基準薬剤	
8月上旬	晩腐病	アミスター10フロアブル	1,000倍
	べと病	又はストロビードライフロアブル	2,000倍
	灰色かび病	又はホライズンドライフロアブル	2,500倍
	チャノキイロ アザミウマ		
8月中旬	べと病 チャノキイロ アザミウマ	レーバスフロアブル	3,000倍

- 注) 1 この時期の散布は、果面汚染防止のため展着剤を使用しない。
 2 ホライズンドライフロアブルは、灰色かび病対策で使用しない。
 3 晩腐病対策
 発病果粒や発病果房は見つけ次第摘み取って、土中深く埋めるなどの処分をする。また、園地内の排水や通風を良くし、過湿にならないようにする。
 4 べと病対策
 被害葉・果房は見つけ次第摘み取り、処分する。また、排水対策、薬剤散布など防除対策を徹底する。
 長雨が見込まれ、発生が懸念される場合は、「8月下旬」にランマンフロアブル2,000倍又はライメイフロアブル4,000倍を特別散布する。
 5 灰色かび病対策
 長期貯蔵向けでは、袋かけ前の「7月下旬」から「8月上旬」にフルーツセイバー1,500倍を特別散布する。

6 チャノキイロアザミウマ対策（袋かけ前）

発生が懸念される園地では、「大豆粒大（7月中旬）」以降、袋かけ前まで10日間隔で散布する。

「8月上旬」及び「8月中旬」はディアナWDG10,000倍又はデリゲートWDG10,000倍を特別散布する。

薬剤散布後、薬液が乾いてから速やかに袋かけを行う。

野菜

高温期に対応した温度や水分管理の徹底と、病害虫の早期発見、
早期防除に努めよう！

◆ トマト ◆

1 かん水と追肥

- ・かん水と追肥の間隔は毎日～1日おきで実施する。
- ・かん水量は、1株当たり1.5リットルを基準とし、28℃以上の気温が予想される日は、1株当たり2リットルとする。30℃以上の気温が予想される日は、午後にも追加で1株当たり1リットルかん水を行う。
- ・品種がりんか409、桃太郎ワンダーの場合は、1回当たりのかん水量は基準量より1割多くする。
- ・2本仕立ての場合は、側枝1本を1株と換算し、1株当たりのかん水量は1本仕立ての2倍量とする。
- ・1回当たりの追肥量は、10日間の窒素成分の合計が2.0～2.5kg/10aを目安とし、草勢に応じて追肥量を調整する。

2 葉面散布

草勢の維持や葉先枯れ、ガク枯れ、落花、徒長を予防するため、メリット黄400倍を各段2～3日おきに2回、開花花房を中心に葉面散布する。

3 高温対策

- ・8月中旬頃までを目処に、7～10日の間隔で通路かん水を行う。
- ・被覆遮光資材や塗布遮光資材等を活用して、ハウス内の温度をできるだけ下げる。遮光期間は8月下旬までとする。
- ・高温期は地温上昇防止と吸水促進のため、下葉の摘葉は、通常より多く葉を残すようにする（収穫花房下5枚）。

4 病害虫防除

- ・病害は、灰色かび病、葉かび病、すすかび病を主体に作用性の異なる薬剤を組合せたローテーション散布とする。
- ・アザミウマ類、オオタバコガ、トマトキバガの発生が増加する時期のため、早期に発見し、防除を徹底する。

花き

ハウスの温度管理と病害虫の防除を徹底しよう！

◆キク◆

1 今後の作業

夏秋ギクの収穫は、つぼみが十分に膨らみ、2～3部咲きの頃に行う。朝夕の涼しい時間帯に収穫し、朝露などで濡れた場合は、通風を図って葉を乾かしてから出荷する。収穫後に株養成する場合は土寄せや追肥を行い、養成しない場合はできるだけ早めに残渣を処分する。

秋ギクはハウスを積極的に換気する。また、高温時は必要に応じて遮光し、ハウス内温度をできるだけ下げる。特に、シェード栽培では、夜間開放を行い夜温を下げる。

2 病害虫防除

ヤガ類、アザミウマ類、ハダニ類が多発しやすい時期なので、早期発見・早期防除に努める。

特にオオタバコガの幼虫は、生長点やつぼみに侵入し、著しく商品価値を落とすため、薬剤散布に加えて、あらかじめハウスの入り口やサイドに防虫ネットを設置し、成虫の侵入を防除すると効果的である。

◆トルコギキョウ◆

1 今後の作業

高温期は葉先枯れ等の生理障害が出やすいため、換気を積極的に行い、遮光やカルシウム剤の葉面散布等による予防に努める。

発らい期以降は、かん水を控えて茎を堅く仕上げるが、朝夕の涼しい時間帯でも萎れるようであれば軽くかん水を行う。

発らい後は、すみやかに1番花を摘み取り、2番花以降の揃いを良くする。

収穫は、朝夕の涼しい時間帯に行い、直ちに前処理剤を処理する。

2 病害虫防除

上記キクを参照。

ほ場周辺や園地などの草刈作業が多くなる時期です

刈払機や草刈機の事故に注意しましょう！

- 作業の前に、草むらに潜む穴や切り株、石、空き缶などを点検しましょう。
- 保護具を身につけ、飛散防止カバーは外さないで作業をしましょう。
- 草詰まりの除去や刈払機を置くときは、必ずエンジンを止めましょう。

農作業中は熱中症に気をつけましょう

- 日中の暑い時間帯は作業を避けるとともに休憩をこまめに取りましょう！
- 通気性の良い作業着や帽子を着用し、汗で失われる水分や塩分を十分に補給しましょう！

6～8月は「農薬危害防止運動」実施期間です

農薬の適正使用と隣接農地への飛散防止に十分気をつけましょう

- 残留基準値超過を防ぐために、日頃から農薬ラベル（適用農作物や使用時期、希釈倍数等）を確認し、使用記録の記帳を行いましょ。
- 使い残した農薬などは、河川等へ絶対捨てない。
- 農薬を使用する場合には、必ず最新の「農薬登録情報」を確認しましょ。
- 農薬は鍵のかかる専用の場所に保管し、管理を徹底しましょ。
- クロルピクリン剤など土壌くん蒸剤を使用する際は、必ずポリエチレンフィルム等（厚さ0.03mm以上または難透過性の資材）で被覆しましょ。
- 市販されている除草剤には、農作物等の栽培管理に使用できない「非農耕地専用除草剤」があるので御注意ください。

ツキノワグマ出没警報発令中！

- ツキノワグマ出没警報発令中です。
- 農作業は、1人での作業を避け、ラジオやクマよけスプレーを携帯するなど、人身被害の防止に努めましょ。