

■ 農作物の生育状況と今後の対策等(10月)

令和8年10月15日
青森県三八農林水産事務所
農業普及振興室

I 土地利用型作物

1 水稻

(1) 刈取り進ちょく状況

管内の稲刈りは、刈取り始め(5%)が9月20日で平年並、刈取り最盛期(50%)は10月3日で平年より1日遅く、刈取り終わり(95%)は平年並の10月15日頃になると思われる。

(2) 今後の対策等

稲わらは焼却せず、堆肥化やすき込みなど有効利用に努める。

稲わらをすき込む場合は、田植え後、「ガスわき」の発生による生育不良が多くみられることから、秋のすき込みを基本とし、稲刈り後なるべく早い時期に耕起深5～7cm程度の浅起こしで実施する。

2 大豆

(1) 生育の状況

10月中旬から成熟期を迎え、コンバインによる収穫適期になると推定される。

(2) 今後の対策等

汚粒発生を防止するため、大型雑草や青立株の抜き取りを行い、適期に収穫する。

3 小麦

(1) 生育の状況

10月7日からは種作業が行われている。

II 野菜

1 ながいも

(1) 生育の状況

ア 生育観測ほ

10月9日現在、いも長、いも重、いも径は平年をやや下回っている。

病害虫は、葉渋病、ナガイモコガの食害がみられる。

イ 一般ほ場

病害は葉渋病、炭そ病が発生しており、一部のほ場では下葉が枯れているところが見られる。虫害はナガイモコガの食害が見られる。

表 1 ながいも生育観測ほの生育状況（10月9日現在）

年 度	定 植 期						つるの ネット頂 到達日	9 月 10 日現在 (本年調査日:9月 10日)			10 月 10 日現在 (本年調査日:10月9日)			
	植付 期 (月 日)	種いも の種類	萌 芽			欠株 率 (%)		いも長 (cm)	いも重 (g)	いも径 (mm)	いも長 (cm)	いも重 (g)	いも径 (mm)	病害虫の 発生状 況
			始 め 期 揃い											
			(月 日)	(月 日)	(月 日)									
本 年 (平年比)	5/8 遅1日	ガンク欠	6/15 遅7日	6/18 遅7日	6/20 遅7日	0	7/15 遅7日	75.3 90%	978 93%	58.4 101%	89.0 94%	1,247 95%	54.9 94%	少
平 年	5/7	ガンク欠	6/8	6/11	6/13	0	7/8	83.5	1,046	58.0	94.8	1,310	58.2	
前 年	5/14	ガンク欠	6/18	6/20	6/23	0	7/10	92.3	1,321	60.0	103.3	1,696	59.1	少

※庄司系2年子・120～150g ガンク切除

※平年：平成28～令和7年の平均値

（2）今後の対策等

通路に落ちたむかごの処理等、収穫に向けた準備を計画的に行う。

アクが発生しないように早掘りを行わない。

2 にんにく

（1）作業進捗

植付け作業の始まり（5%）は、平年より4日早い9月24日で、最盛期（50%）は、ほぼ平年並の10月6日となった。降雨が少なく、作業も順調に進んだとみられる。

植付け作業の終わり（95%）は、ほぼ平年並の10月18日頃と見込まれる。

（2）今後の対策等

植付けが遅れている場合は、ほ場の条件を確認しながら、出来るだけ早く植付けする。

3 トマト

（1）生育の状況

ア 生育観測ほ

気温が低下してきたことに加え、すすかび病が広がっている影響で収穫量は少なく経過している。すすかび病以外では、灰色かび病の発生がみられるほか、タバコガ類、トマトキバガの発生が散見される。

イ 一般ほ場

少照や低温の影響で小玉傾向と着色遅れの状況のため、出荷量は少なく経過している。病害虫は、灰色かび病、すすかび病・葉かび病、タバコガ類、トマトキバガ、コナジラミ類の発生がみられる。

（2）今後の対策等

裂果を防ぐため、夜間はハウスを閉めて保温し、日中は適宜開放して湿度を下げる。また、葉かきも行う。

病害虫の発生状況に合わせて、適切に防除する。

4 いちご

(1) 生育の状況

ア とちおとめ

定植期は8月26日で、平年より1日遅かった。

草高、葉柄長は平年をやや下回っているが、ほぼ全株で開花が認められた。

病虫害は特にみられない。

イ よつぼし

定植期は9月16日で、平年より1日早かった。

草高は平年を下回り、葉柄長は平年をやや下回っている。

害虫はコナジラミ類の発生が認められた。

表2 いちご生育観測ほの生育状況（10月9日現在）

品種名	年度	定植期	草高 (cm)	葉柄長 (cm)	小葉長 (cm)	小葉幅 (cm)	クラウン径 (mm)
とちおとめ	本年	8月26日	19.5	12.1	11.2	9.8	14.4
	(平年比)	(1日遅い)	(96%)	(95%)	(100%)	(109%)	(92%)
	平年	8月25日	20.4	12.8	11.2	9.0	15.7
	前年	8月26日	23.2	14.5	11.6	9.6	19.3
よつぼし	本年	9月18日	13.1	9.2	7.0	5.3	12.9
	(平年比)	(1日遅い)	(94%)	(97%)	(84%)	(80%)	(101%)
	平年	9月17日	14.0	9.5	8.3	6.6	12.8
	前年	9月16日	12.7	9.8	8.6	6.8	12.9

注) 平年 「とちおとめ」：平成28年～令和7年（植付年）の10か年平均

「よつぼし」：令和元年～令和7年（植付年）の7か年平均

(2) 今後の対策等

適正な温度管理に努める。

炭疽病、うどんこ病、ハダニ類、コナジラミ類等の防除を徹底する。