




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの**国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。



毎日、飼養家畜の**健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

（平日8:30～17:15） 0173-42-2276（夜間・土日祝） 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの**国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。



毎日、飼養家畜の**健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

（平日8:30～17:15） 0173-42-2276（夜間・土日祝） 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り**控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

（平日8:30～17:15） 0173-42-2276（夜間・土日祝） 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い**状況が続いています。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り**控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・要注意・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い**状況が続いています。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、**持ち込む物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、**飼養管理で使用する物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り**控えるとともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないように**しましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・要注意・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い**状況が続いています。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、**持ち込む物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、**飼養管理で使用する物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



- ☐ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。
- ☐ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。
- ☐ 畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。
- ☐ 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- ☐ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗いの槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、**車内も消毒**。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

（平日8:30～17:15） 0173-42-2276（夜間・土日祝） 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り**控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

（平日8:30～17:15） 0173-42-2276（夜間・土日祝） 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い**状況が続いています。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

（平日8:30～17:15） 0173-42-2276（夜間・土日祝） 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、**車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



- ☐ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- ☐ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、**持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- ☐ 畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、**飼養管理で使用する物品は定期的に消毒**しましょう。
- ☐ 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控え**るとともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。
- ☐ **毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認



毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認



毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

- ・ 要注意・
- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い**状況が続いています。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り**控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。

※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒。
フロアマットの交換や**ペダル等、車内**も消毒。

・ 要注意 ・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459




韓国で口蹄疫が発生！



韓国では、2026年7月上旬に牛・豚で口蹄疫の発生が確認されました。現在、**我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています**。感染拡大を防止するためには**早期通報が重要**ですので、徹底をお願いします！

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）



農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外**の立入を制限しましょう。



農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。



畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。



従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控**えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。



毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ちに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。
踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。
また、**水や消毒液が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤだけでなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等**の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



タイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒。
フロアマットの交換やペダル等、車内も消毒。

・要注意・

- ★ 口蹄疫ウイルスには強いアルカリ性又は酸性を有する消毒薬が有効ですが、消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**
- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

《つがる広域家畜保健衛生所》

(平日8:30～17:15) 0173-42-2276 (夜間・土日祝) 090-8788-7459