

上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所 0176-23-6235 (FAX 0176-23-3044)
上十三地区家畜衛生推進協議会 0176-25-2362 (FAX 0176-24-3888)
(一社)青森県畜産協会 017-722-4331 (FAX 017-731-1196)

高病原性鳥インフルエンザ

患畜確認

令和2年11月5日及び8日に香川県の養鶏場で今シーズン初となる高病原性鳥インフルエンザの患畜が確認されました。

- 1 例目 香川県三豊市 採卵鶏 約33万羽 (H5N8亜型)
- 2 例目 香川県東かがわ市 採卵鶏 約4.8万羽 (H5N8亜型)

農場への鳥インフルエンザ侵入防止チェックポイント

- ☑ 関係者以外の農場への立入り制限
これらの記録はありますか？
- ☑ 出入りする人・車両・物等の消毒徹底
適正な消毒薬を用いた消毒がされていますか？
- ☑ 鶏舎壁や防鳥ネットの破損確認
壁の穴をふさいだり網を2重に張るなどの対応を速やかに
- ☑ 鶏舎周囲のチェック
鶏舎周囲に物が散乱し、野生動物の隠れ家になっていませんか？
- ☑ 鶏舎の清掃・消毒
鶏舎周囲に石灰帯を作りましょう
鶏舎専用の衣類・履物を準備しましょう
鶏舎入口に踏込消毒槽を設置しましょう
踏込消毒槽の適正なものを選択し、汚れたら交換しましょう



石灰が混ざることによって
効果が弱まる消毒薬に注意

次のような症状を見られたら速やかに家畜保健衛生所へ

- * 急激に死亡する鶏の数が増えた
- * 過去3週間の死亡率と比べて、死亡率が2倍以上になった
- * 5羽以上まとまって死亡している
- * まとまって嗜眠・沈うつ状態になっている（写真1・2）
- * 皮下出血がある（写真3）
- * トサカや肉垂が暗青色に変化した（写真4）
- * 急激に産卵率が低下した



写真1. 感染し、元気をなくした鶏（真瀬昌司原図）



写真2. 突然の沈うつ、すぐ死亡（山口県提供）



写真3. 脚部の皮下出血（真瀬昌司・谷村信彦原図）



写真4. 宮崎株実験染鳥 肉垂のチアノーゼが見られる
（動物衛生研究所提供）

写真出典

平成27年9月9日 農林水産大臣公表

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針 参考資料

十和田家畜保健衛生所

電話 0176-23-6235(平日) 携帯 090-6453-7023(休日・夜間)

ホームページ

十和田家畜保健衛生所

検索