

## 青森県の特産地鶏「青森シャモロック」の生産定義

### 1 特徴と交配様式

#### (特徴)

- ・青森県が独自に開発した地鶏
- ・羽色は白黒の横斑紋、鶏冠(とさか)は三枚冠であり、体型的にやや直立
- ・雌雄平均体重は、14週間飼育で約2.8 kg
- ・肉のきめが細かく、ダシが良く出る
- ・青森シャモロック専用の飼育マニュアルに基づいて飼育されている
- ・特産地鶏「青森シャモロック」ブランド化推進協議会で承認された、指定生産農場でのみ飼育されている。

#### (交配様式)

父親

横斑シャモ

(在来種由来血液百分率 100%)



母親

速羽性横斑プリマスロック

(在来種由来血液百分率 50%)



×




青森シャモロック

(在来種由来血液百分率 75%)

この交配様式で生まれた鶏だけが「青森シャモロック」です

## 2 ヒナ供給及び生産指定農場認定までの流れ



## 3 飼育基準等

《飼育基準》

事項	青森シャモロック	特定JAS(地鶏肉)規格の基準	備考
素ヒナ	在来種の血液割合75%	在来種の血液割合50%	
飼育期間	孵化日から♂は100日 ♀は120日	80日以上	
飼育方法	28日以降平飼い	28日以降平飼い	飼養可能羽数等は鶏舎を測定して算出
飼育密度	28日以降5羽/m <sup>2</sup> 以下	28日以降10羽/m <sup>2</sup> 以下	

《標準飼料給与体系》

給与期間	飼料名
餌付け～27日齢	青森シャモロック用前期飼料または、タンパク質20%以上、代謝エネルギー3,000kcal/kg以上の肉用鶏専用配合飼料（抗菌性飼料添加物を含まないもの）
28日齢～出荷	青森シャモロック用後期飼料または、タンパク質16%以上、代謝エネルギー2,900kcal/kg以上の肉用鶏専用配合飼料（抗菌性飼料添加物を含まないもの）
出荷前2週間	ガーリック粉末を0.3%添加